

【台風通過後の対策】サツマイモ基腐病

台風や長雨後は、基腐病の発生が増加する可能性非常に高い

【1. ほ場の排水対策】

・ほ場の排水状況を確認し、ほ場が冠水したり、ほ場内に水たまりがあった場合には、土砂等の堆積物を除去してほ場外に排水する。

【2. 発病株等の抜き取り】

・ほ場を見回り、生育不良、変色した葉を見つけたら、株元を確認し、茎の地際部が黒～褐色に変色した株を抜根し、ほ場外に持ち出して処分する。

【3. 薬剤防除】


・台風前に、予防効果のある薬剤を散布できなかった場合は、台風後に治療効果のある 「アミスター20フロアブル」（使用回数は3回以内）または、「トリフミン水和剤」（使用回数は2回以内）の散布をお願いします。

・2の発病株抜き取りを行った場合も、薬剤散布をお願いします。

※耐性菌が発生しやすいため、土壌消毒でフリントフロアブル25を使用した場合には、**同系統のアミスター20フロアブルは使用しないよう**お願いします。

※薬剤についての問い合わせは普及センターまでお願いします。

※薬剤を使用する際は、ラベルの使用法、注意事項を読み、希釈倍数や使用法を確認しご使用ください。



R6年度 児湯農業改良普及センター

問い合わせ先：0983-43-2311