

◎定期予防接種の種類、接種時期、接種回数

予防接種の種類	定期予防接種として接種できる期間	標準的な接種期間	間隔・回数
ロタウイルスワクチン	ロタリックス（1価）	出生6週0日後～24週0日後	初回接種については、生後2月に至った日から出生14週6日後までの間 27日以上の間隔をおいて2回
	ロタテック（5価）	出生6週0日後～32週0日後	初回接種については、生後2月に至った日から出生14週6日後までの間 27日以上の間隔をおいて3回
B型肝炎ワクチン	1歳に至るまでの間	生後2月に至った時から生後9月に至るまでの間	初回：27日以上の間隔をおいて2回
			1回目の注射から139日以上の間隔をおいて1回
沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン	生後2月から生後60月に至るまでの間	初回接種：生後2月から生後7月に至るまでの間	生後24月に至るまでの間に、27日以上の間隔をおいて3回
沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン		追加接種：生後12月から生後15月に至るまでの間に初回接種終了後から60日以上の間隔をおいて1回	初回接種終了後60日間以上の間隔をおいて、生後12月に至った日以降に1回
五種混合ワクチン（DPT－IPV－Hib）	第1期：生後2月から生後90月に至るまでの間	第1期初回：生後2月に達した時から生後7月に至るまでに達した時の期間	20日以上の間隔をおいて3回
		第1期追加：第1期初回接種（3回）終了後6月から18月までの間隔をおく	第1期初回接種（3回）終了後、6月以上の間隔をおいて1回
四種混合ワクチン（DPT－IPV）	第1期：生後2月から生後90月に至るまでの間	第1期初回：生後2月に達した時から生後12月に達するまでの期間	20日以上の間隔をおいて3回
		第1期追加：第1期初回接種（3回）終了後12月から18月までの間隔をおく	第1期初回接種（3回）終了後、6月以上の間隔をおいて1回
二種混合ワクチン（DT）	第2期：11歳以上13歳未満	11歳に達した時から12歳に達するまでの期間	
BCGワクチン	1歳に至るまでの間	生後5月に達した時から生後8月に達するまでの期間	
麻しん風しん混合（MR）ワクチン	第1期：生後12月から生後24月に至るまでの間		
	第2期：5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該終期に達する日の前日までの間		
水痘ワクチン	生後12月から生後36月に至るまでの間	1回目の注射：生後12月から生後15月に達するまで	3月以上（標準的には6月から12月まで）の間隔をおいて2回
		2回目の注射：1回目の注射終了後6月から12月までの間隔	
日本脳炎ワクチン	第1期初回：生後6月から生後90月に至るまでの間	3歳に達した時から4歳に達するまでの期間	6日以上（標準的には6日から28日まで）の間隔をおいて2回
	第1期追加：生後6月から生後90月に至るまでの間	4歳に達した時から5歳に達するまでの期間	初回接種終了後6月以上（標準的にはおおむね1年を経過した期間）の間隔をおいて1回接種
	第2期：9歳以上13歳未満	9歳に達した時から10歳に達するまでの期間	
ヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチン	12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間の女子	13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間	2価：1月の間隔をおいて2回、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回
			4価：2月の間隔をおいて2回、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回
			9価：6月の間隔をおいて2回接種（※初回15歳未満）
			9価：2月の間隔をおいて2回、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回（※初回15歳以上）