

◎定期予防接種の種類、接種時期、接種回数

予防接種の種類	定期予防接種として接種できる期間	標準的な接種期間	間隔・回数
ロタウイルスワクチン			
ロタリックス（1価）	出生6週0日後～24週0日後	初回接種については、生後2月に至った日から出生14週6日後までの間	27日以上の間隔をおいて2回
ロタテック（5価）	出生6週0日後～32週0日後	初回接種については、生後2月に至った日から出生14週6日後までの間	27日以上の間隔をおいて3回
B型肝炎ワクチン	1歳に至るまでの間	生後2月に至った時から生後9月に至るまでの間	初回：27日以上の間隔をおいて2回 1回目の注射から139日以上の間隔をおいて1回
沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン	生後2月から生後60月に至るまでの間	初回接種：生後2月から生後7月に至るまでの間	生後24月に至るまでの間に、27日以上の間隔をおいて3回
沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン		追加接種：生後12月から生後15月に至るまでの間に初回接種終了後から60日以上の間隔をおいて1回	初回接種終了後60日間以上の間隔をおいて、生後12月に至った日以降に1回
五種混合ワクチン（DPT-IPV-Hib）	第1期：生後2月から生後90月に至るまでの間	第1期初回：生後2月に達した時から生後7月に至るまでに達した時の期間 第1期追加：第1期初回接種（3回）終了後6月から18月までの間隔をおく	20日以上の間隔をおいて3回 第1期初回接種（3回）終了後、6月以上の間隔をおいて1回
四種混合ワクチン（DPT-IPV）	第1期：生後2月から生後90月に至るまでの間	第1期初回：生後2月に達した時から生後12月に達するまでの期間 第1期追加：第1期初回接種（3回）終了後12月から18月までの間隔をおく	20日以上の間隔をおいて3回 第1期初回接種（3回）終了後、6月以上の間隔をおいて1回
二種混合ワクチン（DT）	第2期：11歳以上13歳未満	11歳に達した時から12歳に達するまでの期間	
BCGワクチン	1歳に至るまでの間	生後5月に達した時から生後8月に達するまでの期間	
麻疹風しん混合（MR）ワクチン	第1期：生後12月から生後24月に至るまでの間 第2期：5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該終期に達する日の前日までの間		
水痘ワクチン	生後12月から生後36月に至るまでの間	1回目の注射：生後12月から生後15月に達するまで 2回目の注射：1回目の注射終了後6月から12月までの間隔	3月以上（標準的には6月から12月まで）の間隔をおいて2回
日本脳炎ワクチン	第1期初回：生後6月から生後90月に至るまでの間 第1期追加：生後6月から生後90月に至るまでの間 第2期：9歳以上13歳未満	3歳に達した時から4歳に達するまでの期間 4歳に達した時から5歳に達するまでの期間 9歳に達した時から10歳に達するまでの期間	6日以上（標準的には6日から28日まで）の間隔をおいて2回 初回接種終了後6月以上（標準的にはおおむね1年を経過した期間）の間隔をおいて1回接種
ヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチン	12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間の女子	13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間	9価：6月の間隔をおいて2回接種（※初回15歳未満） 9価：2月の間隔をおいて2回、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回（※初回15歳以上） 1回目の接種が2価または4価の場合：2月の間隔をおいて9価を1回、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回 1回目または2回目までの接種が2価または4価の場合：1回目の接種から6月の間隔をおいて1回